

Nog.).

Distribution. Endemic to China and Formosa.

8) *Leucodon exaltatus* C. Müll. Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 3: 112 (1896).

Syn.: *L. giralddii* C. Müll. l. c. 112, syn. nov.; *L. dozyoides* Broth. et Par. Bull. Herb. Boiss. 2 sér., 2: 924 (1902), syn. nov.

Representative specimens examined. China, Shensi, Kuan-tou-san (Girald 888, isotype, 2129, S), Shensi, Siku-tzui-san (Girald 1033, type of *L. giralddii*, FI). Japan, Shikoku, Mt. Tsurugi-zan (Faurie 1168, isotype of *L. dozyoides*, KYO).

Distribution. Japan, Korea, China.

References

- Brotherus, V. F. (1925) Musci in Engler u. Prantl, Nat. Pflanz. 11: 1-542. Leipzig. — (1929) Musci in Handel-Mazzetti, Symb. Sin. 4: 1-147, Wien. Cardot, J. (1904) Beih. Bot. Centralbl. 17: 1-44. Chen, P. C. (1955) Feddes Repertorium 58: 23-52. Dixon, H. N. (1936) Journ. Bot. 1936: 1-10. — (1941) *Ibid.* 1941: 137-145. Noguchi, A. (1936) Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa 26: 34-43. — (1947) Journ. Hattori Bot. Lab. 2: 27-79. Okamura, S. (1916) Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 38(4): 1-100.

○地衣類思い出話 (12) (富樫 誠) Makoto TOGASHI: Miscellaneous notes on lichens or lichenological survey (12)

昭和 27-28 年頃筆者は大和の大峯山登山に熱中し、殊に *Oropogon Tanakae* Asah. を採集するのその目的の一つで、其根拠地吉野郡天川村、洞川でも獲物を捜し廻ったのであるが、殊に龍泉寺で採集した *Usnea dorogawensis* Asah. は著しいものである。此地衣は小形の *Usnea* の一種で、外形殊に粉芽体の形がフィリピン産の *Usnea pycnoclada* Vain. によく似て居り、粉芽も粉末状で針芽状でない。然し葉体に赤褐色の斑紋があり、アカサルオガセの族である。更に注意すべき点は皮層の赤斑はむしろ少数で、皮層内部の髓の菌糸が赤色々素を含んで居るのが著しい。所で、其後この種は高野山や大和の室生寺で採集され、又丹波の一地方、三河乳岩附近、近江醒ヶ井と本州中央に限定されて出現して居る事は注目に価する。